



Prima Bio
Solutions



PRIHRANA POVRČA

Program za papriku



CILJ PROGRAMA

Program za folijarnu i fertirigaciju prihranu paprike je osmišljen za profesionalne zasade. Bakterioze paprike su veliki problem i na njih se deluje aktivno preparatima Crop Protect i Cupractive. Ovi preparati deluju sistemično i kontaktno, pa mogu vrlo uspešno odbraniti papriku od bakterioza, ali i suzbiti već odmaklu infekciju.

Razvija se intenzivno koren u početnim fazama, a biljka se obezbeđuje svim potrebnim mikroelementima, od kojih je najvažnije gvožđe. Huminske kiseline koje se puštaju kroz sistem čine hraniva dostupnim mladom korenu paprike. Kada se pojave cvetovi deluje se na što bolju oplodnju i kasnije kvalitet i krupnoću ploda. Ovakav program je jedinstven

PRVI TRETMAN

Posle rasađivanja

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Amino Humic* | 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

DRUGI TRETMAN

15 dana posle rasađivanja

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Amino Humic* | 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

TREĆI TRETMAN

Oko 10. juna

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 1 l/ha (folijarno) |
| 3. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 4. Naturquel Fe Core | 5kg (kroz sistem za navodnjavanje) |

ČETVRTI TRETMAN

Oko 20. juna

- | | |
|-----------------|----------------------------------------|
| 1. Algafert | 2 l/ha (folijarno) |
| 2. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno) |
| 3. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 4. Amino Humic* | 10 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

PETI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno) |
| 3. Cupractive | 2 l/ha (folijarno) |

ŠESTI TRETMAN

Početak cvetanja

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Ligno+Ca | 2 l/ha (folijarno) |
| 3. Borocomplex | 1 l/ha (folijarno) |

i može obezbediti zdrav zasad paprike, uz vrhunske prinose i kvalitet ploda.

SEDMI TRETMAN

Pojava prvih plodova

1. Algafert 2 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

OSMI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Ligno+Ca 2 l/ha (folijarno)

DEVETI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 2 l/ha (folijarno)
2. Kolor Neutro 2 l/ha (folijarno)
3. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

DESETI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Ligno+Ca 2 l/ha (folijarno)

JEDANAESTI TRETMAN

sedam dana pred berbu

1. Algafert 2 l/ha (folijarno)
2. Kolor Neutro 2 l/ha (folijarno)
3. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

* najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima



Program za paradajz

PRVI TRETMAN

Posle rasađivanja

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Naturfos Zn/Mn 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Amino Humic* 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DRUGI TRETMAN

15 dana posle rasađivanja

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Amino Humic* 10 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

pre cvetanja

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Crop Protect 2,5 kg/ha
(folijarno, u slučaju pojave bolesti)
3. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core 5kg (kroz sistem za navodnjavanje)

ČETVRTI TRETMAN

Početak cvetanja

1. Algafert 2 l/ha (folijarno)
2. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)
3. Crop Protect 2,5 kg/ha
(folijarno, u slučaju pojave bolesti)

PETI TRETMAN

Pojava prvih plodova

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Crop Protect 2,5 kg/ha
(folijarno, u slučaju pojave bolesti)
3. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

ŠESTI TRETMAN

Prva promena boje ploda

1. Kolor Neutro 2 l/ha (folijarno)
2. Ligno+Ca 2 l/ha (folijarno)

SEDMI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana*

1. Algafert 2 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)
3. Crop Protect 2,5 kg/ha (folijarno, u slučaju bolesti)

šesti i sedmi tretman se rade naizmenično na 7 dana sve dok ima cveta i ploda
*najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima

CILJ PROGRAMA

Paradajz ima potrebu da razvije veliku lisnu masu pre nego što se pojave plodovi. Iz tog razloga se posle rasađivanja deluje na razvoj korena, a kasnije se razvija intenzivno lisna masa. Biljka se priprema za cvetanje, a kada dođe do cvetanja, stimuliše se oplodnja cveta.

Paradajzu se daje Kolor Neutro koji intenzivno boji plod na prirodan način, a sa njim i kalcijumom se tretira svaka rodna grana. Kombinacije kalijuma, kalcijuma i mikroalgi dovode do toga da paradajz bude čvrst, bez pojave zelene kragne, a da se taj kvalitet dobije bez upotrebe sitnetičkih hormona.

Program za lubenicu i dinju

PRVI TRETMAN

Kad je visina biljke oko 10-15 cm

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Amino Humic* 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DRUGI TRETMAN

15 dana posle prethodnog

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Naturfos Zn/Mn 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

15-20 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (folijarno)
3. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)

ČETVRTI TRETMAN

početak cvetanja

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

PETI TRETMAN

Razvoj plodova

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

Poslednji tretman se može ponoviti na svakih 7-10 dana jer utiče na čvrstinu, krupnoću i aromu plodova. Nikakve karence nema, pa se može tretirati normalno tokom berbe.

*najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima



CILJ PROGRAMA

Razvijanje vreže je glavni zadatak programa u početku vegetacije. Razvija se korenov sistem, ali i nadzemni deo biljke. Prvi pojavi plodova deluje se na čvrstinu, krupnoću i aromu plodova.



Program za kupus

PRVI TRETMAN

Posle rastađivanja

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Naturfos Zn/Mn | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

DRUGI TRETMAN

Sedam dana posle prethodnog tretmana

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

TREĆI TRETMAN

Početak formiranja glavice

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha (folijarno) |

ČETVRTI TRETMAN

10 dana pre kasnije

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Borocomplex | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Ligno+Ca | 2 l/ha (folijarno) |

CILJ PROGRAMA

Kupus je povrće kome je najvažnije razviti lisnu masu. Zato se taj razvoj forsira kroz čitavu vegetaciju. Ipak, na početku se mlada biljka tera da brzo razvije korenove žilice. Lisna masa se razvija brzo, a pri formiranju glavica mora da se obrati pažnja na izvore kalcijuma i bora, da ne bi došlo do pucanja glavica. Kupus veoma dobro reaguje na prihranu, a ono što mu se da, mnogostruko vrati.

Program za krastavac

PRVI TRETMAN

Kad je visina biljke oko 10 cm

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Amino Humic* 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DRUGI TRETMAN

15 dana posle prethodnog

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Naturfos Zn/Mn 3l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

7 pre cvetanja

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Naturfos Zn/Mn 1 l/ha (folijarno)
3. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core 5 kg (kroz sistem za navodnjavanje)

ČETVRTI TRETMAN

Početak cvetanja

1. Algafert 2 l/ha (folijarno)
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (folijarno)

PETI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Crop Protect 2,5 kg/ha (folijarno)
3. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)

Poslednja dva tretmana raditi naizmenično dok traje plodonošenje.

*najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima



CILJ PROGRAMA

Ovaj program za krastavac intenzivno razvija korenov sistem i podstiče rast biljke. U program je ubačen Naturfos Zn/Mn koji ima fosfite i deluje aktivno protiv plamenjače krastavca. Tokom celog programa Algafert ne dozvoljava biljci da uspori rast nego je konstantno razvija kroz sve fenofaze. Biofat 600 utiče na veličinu ploda i snabdeva plod kalcijumom, dok Crop Protect takođe ima aktivno dejstvo protiv plamenjače.

Ovakav program u kombinaciji sa programom za zaštitu bilja daje najsavremeniji pristup za ishranu i zaštitu krastavca.

Program za crni luk

PRVI TRETMAN

Kad je visina biljke oko 10-15 cm

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Amino Humic* | 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

DRUGI TRETMAN

15 dana posle prethodnog

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

TREĆI TRETMAN

15-20 dana posle prethodnog tretmana

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 1 l/ha (folijarno) |

ČETVRTI TRETMAN

30-40 dana pre vađenja

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha (folijarno) |

PETI TRETMAN

15-20 dana pre vađenja

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Algafert | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha (folijarno) |

CILJ PROGRAMA

Intenzivno se razvija koren na početku i razvoj lista. Biljka se obezbeđuje cinkom, manganom, fosforom u obliku fosfita što dodatno razvija korenov sistem. Huminske i fulvo kiseline će učiniti hraniva dostupnijim crnom luku. Na kraju se lukovica hrani kalcijumom, intenzivira se deoba čelija lukovice fitohormonima, utiče se na veći prinos, ali i čvrstinu glavice i na čvrstinu ovojnih listova.

Pri pojavi tripsa koristiti preparat Faston, sa dovoljnom količinom vode da preparat sklizne niz listove i dotakne tripse. Obično je to između 700 i 850 litara vode po hektaru, što zavisi od veličine luka.

*najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima

Program za pasulj, grašak i boranija

PRVI TRETMAN

Prva troliska

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Crop Protect 2,5 kg/ha (folijarno)

DRUGI TRETMAN

Druga troliska

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Biopower Eco 3 l/ha (folijarno)
3. Crop Protect 2,5 kg/ha (folijarno)

TREĆI TRETMAN

Treća troliska

1. Acid3Control 1 l/ha (folijarno)
2. Algafert 1 l/ha (folijarno)
3. Biofat 600 1 l/ha (folijarno)
4. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)

ČETVRTI TRETMAN

Prva polovina cvetanja

1. Acid3Control 1 l/ha (folijarno)
2. Algafert 1 l/ha (folijarno)
3. Biofat 600 1 l/ha (folijarno)
4. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)

PETI TRETMAN

Druga polovina cvetanja

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 1 l/ha (folijarno)

ŠESTI TRETMAN

5-7 dana posle kraja cvetanja

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 1 l/ha (folijarno)



CILJ PROGRAMA

Na početku vegetacije pa sve do cvetanja, ove mahunarke mogu oboleti od bakterioza. Crop Protect vrlo uspešno rešava ove bolesti, zato se tretira u periodu kada su biljke male. Pred cvetanje, biljka se priprema da razvije što više rodni grančica, a zatim u cvetanju da se oplodi i napuni mahune. Biljke se istovremeno snabdevaju kalcijumom i deluje se na krupnoću zrna, odnosno mahuna, kako bi kvalitet bio na veoma visok.



Program za korenasto povrće

CILJ PROGRAMA

Korenasto povrće kao što su cvekla, šargarepa, rotkva, rotkvice..., zahteva izuzetnu pažnju razvoju korena. Ipak, korenov sistem ne može lepo da se razvije bez razvoja lisne mase, pa se na početku rasta razvijaju paralelno list i mlad koren, a kasnije se forsira dalji rast korena uz delovanje preparata Biofat 600 koji daje kvalitet i čvrstinu ovom povrću. Njemu će produkti mikroalgi u ovim preparatima će brzo dopremiti sve elemente i fitohormone za razvoj.

PRVI TRETMAN

Na početku vegetacije

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Amino Humic* | 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

DRUGI TRETMAN

Sedam dana posle prethodnog tretmana

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 3l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

TREĆI TRETMAN

7-10 dana posle prethodnog tretmana

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Acid3Control | 1 l/ha (folijarno) |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 1 l/ha (folijarno) |
| 3. Borocomplex | 1 l/ha (folijarno) |

ČETVRTI TRETMAN

7-10 dana kasnije

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 3 lha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 4. Biofat 600 | 2 l/ha (folijarno) |

Poslednji tretman se može ponoviti nekoliko puta na razmaku od 7-10 dana pre vađenja.

*najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima

Program za zelenu salatu

PRVI TRETMAN

Na početku vegetacije

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Amino Humic* 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DRUGI TRETMAN

Sedam dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Acid3Control 1 l/ha (folijarno)
2. Algafert 1 l/ha (folijarno)
3. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)

ČETVRTI TRETMAN

porast rozete

1. Algafert 1 l/ha (folijarno)
2. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)
3. Crop Protect 2,5 kg/ha (u slučaju pojave bolesti)

PETI TRETMAN

7 dana pred berbu

1. Acid3Control 1 l/ha (folijarno)
2. Algafert 1 l/ha (folijarno)
3. Biofat 600 2 l/ha (folijarno)
4. Crop Protect 2,5 kg/ha (u slučaju pojave bolesti)



CILJ PROGRAMA

Kod zelene salate je važno razviti lisnu masu, a za to je potrebno dati mikro i makroelemente da bi se prvo razvio korenov sistem. Kada lišće počne da raste, taj rast se forsira, ali mu se citokininima daje potrebna čvrstina i omogućava se brzo usvajanje kalcijuma, radi čvrstine lista i otpornosti na obolenja. Produkti mikroalgi brzo prodiru kroz stome lista zelene salate i efekti se vide vrlo kratko posle tretmana.

*najbolje je Amino Humic davati na 3 dana razmaka sa ostalim preparatima



***“Gorak ukus lošeg kvaliteta, ostaje dugo
pošto se zaboravi slatkoća niske cene”
B. Frenklin***

Rajko Lazić

dipl. inž. poljoprivrede
direktor
064/8916771
rajko.lazic@pbs.co.rs

Ratko Đorđević

dipl. inž. poljoprivrede
teren Šumadije
064/6491361
ratko.djordjevic@pbs.co.rs

Lidija Petrović

dipl. inž. poljoprivrede
teren Bačke
064/6491367
lidija.petrovic@pbs.co.rs

**PrimaBio
Solutions**

Košut Lajoša 38, Temerin
tel. 021 842 365
mob. 064 89 16 771
e-mail: info@pbs.co.rs